

Medicamento
homeopático



Gotas oftálmicas
10 mL

SIMILASAN-ALERGIC®, gotas oftálmicas estéreis

V2.0 BBR0291

BULA DO PACIENTE

SIMILASAN-ALERGIC®

Apis mellifica D6.....0,303 mL,
Euphrasia
officinalis D6.....0,303 mL,
Sabadilla D6.....0,303 mL.

Medicamento Homeopático

Solução Oftálmica Estéril

Apresentação: Contém
1 frasco de 10 ml

USO ADULTO E PEDIÁ- TRICO ACIMA DE 2 ANOS

Composição: Cada ml contém:
Apis mellifica D6.....0,303 mL,
Euphrasia
officinalis D6.....0,303 mL,
Sabadilla D6.....0,303 mL,
Excipientes q.s.p. 1 ml (ácido
bórico, borato de sódio
decaidratado, nitrato de
sódio, sulfato de prata, água
ultrapurificada). 22 gotas/mL.

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

SIMILASAN-ALERGIC®
é indicado como auxiliar
no tratamento dos sintomas
decorrentes de irritações
oculares como vermelhidão,
inchaço, coceira, queimação e
lacrimejamento. **A indicação
deste medicamento somente
poderá ser alterada a
critério do prescritor.**

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

As indicações terapêuticas
deste medicamento foram
definidas conforme dados
publicados na literatura
homeopática. Este medica-
mento não foi submetido a
estudos clínicos para com-
provação de eficácia.

Este medicamento é preparado
de acordo com os princípios

homeopáticos incluindo o
princípio básico de “semel-
hante pode ser curado pelo
semelhante”. Ele auxilia as
próprias energias de cura
do organismo ao invés de
substituí-las.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento não deve
ser utilizado no caso de hiper-
sensibilidade a qualquer um
dos componentes da fórmula.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Consulte um médico caso a
sua condição não melhore
dentro de 2 a 3 dias ou se sua
condição piorar.

Procure um médico se apenas
um olho for afetado, se o olho
estiver excessivamente dolo-
rido ou se a sua visão estiver
embaçada.

Durante qualquer inflamação
nos olhos não se aconselha
o uso de lentes de contato.
Se, no entanto, for imperioso
utilizá-las, elas devem ser
removidas antes da adminis-
tração do medicamento e
serem recolocadas, no
mínimo, depois de 15 minutos.
O uso de lentes de contato
tende a deixar os olhos mais
sensíveis.

Não utilize o medicamento
se a solução mudar de cor ou
ficar turva.

**Este medicamento não deve ser
utilizado por mulheres grávidas
sem orientação médica ou do
cirurgião-dentista. Informe ao
seu médico ou cirurgião-den-
tista se você está fazendo uso
de algum outro medicamento.**

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Armazenar em local seco à
temperatura ambiente –
até 30 °C.

Prazo de validade: 36 meses.

**Número de lote e datas de
fabricação e validade: vide
embalagem.**

**Não use medicamento com
o prazo de validade vencido.
Guarde-o em sua embalagem
original.**

**Após aberto, válido por
30 dias.**

Características físicas e orga-
nolépticas do medicamento:
líquido límpido, incolor, sem
odor e sabor.

**Antes de usar, observe o
aspecto do medicamento.**

**Caso ele esteja no prazo de
validade e você observe
alguma mudança no aspecto,
consulte o farmacêutico para
saber se poderá utilizá-lo.
Todo medicamento deve ser
mantido fora do alcance das
crianças.**

**Proteger da luz solar e de
fontes de radiação eletromag-
nética como, por exemplo:
forno de microondas, apare-
lho celular, televisão, etc.**

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Desde que não prescrito de
outra forma, utilizar uma a
duas gotas, se necessário,
várias vezes ao longo do dia
ou da noite. A duração do
efeito do medicamento
homeopático pode ser dife-
rente em cada indivíduo; ele
deve ser reaplicado quando o
seu efeito cessar ou quando
os sintomas forem percebidos
novamente.



SIMILASAN-ALERGIC[®], gotas oftálmicas estéreis

V2.0 BBR0291

Se lentes de contato forem utilizadas, recomenda-se aplicar o medicamento no fim do dia, após a remoção das lentes, e de manhã, no mínimo 15 minutos antes de colocá-las. Apertar o conta-gotas de plástico entre o polegar e o indicador e administrar as gotas nos olhos.

Evitar o contato entre a ponta do conta-gotas e o globo ocular, cílios ou dedos.

Recolocar a tampa imediatamente após o uso.

Utilizar antes do vencimento do prazo de validade.

Mantenha sempre a dose e a frequência de uso indicadas pelo prescritor ou o modo de usar sugerido nesta bula. Não desaparecendo os sintomas em até 3 dias, consulte um profissional de saúde. No caso de aparecimento de sinais e sintomas de alerta que indiquem gravidade, procure avaliação médica com urgência.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista o aparecimento de sintomas novos, agravamento de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos.

O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas.

Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

Caso você esqueça de usar o medicamento, não duplique a quantidade de medicamento na próxima aplicação.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Os componentes ativos deste medicamento são ultradiluídos pelo processo de dinamização, de acordo com a farmacopeia homeopática e, portanto, não são tóxicos e não causam efeitos colaterais conhecidos. Raramente pode ocorrer a exacerbação inicial dos sintomas antes que uma melhora seja percebida. Isto faz parte do processo de cura homeopática.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

Em caso de sintomas que causem mal estar durante o tratamento, procure seu médico ou farmacêutico.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Até o momento não são conhecidos sintomas de superdose com este medicamento.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

Medicamento dinamizado notificado junto à Anvisa conforme Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 721, de 1º de julho de 2022.

Responsável Técnico:

Dr. Raul Diniz Ragazzi
CRF-SP nº 56686

Importado por:

Ophthalmos Ltda.
Avenida Manoel Monteiro de Araujo, 1051 - Lote A
Parque São Domingos,
São Paulo, SP
CNPJ: 61.129.409/0001-05
SAC: 0800 2098080

Notificado por:

Ophthalmos Ltda.
Avenida Manoel Monteiro de Araujo, 1051 - Lote B
Parque São Domingos,
São Paulo, SP
CNPJ: 61.129.409/0003-69

Produzido por:

Similasan AG
Chriesiweg 6
CH-8916 Jonen
Suíça

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação de um profissional da saúde.