

Medicamento  
homeopático



Gotas oftálmicas  
10 mL

## SIMILASAN-CLEAR®, gotas oftálmicas estéreis

V2.0 BBR2070

### BULA DO PACIENTE

#### SIMILASAN-CLEAR®

Atropa belladonna D6...0,303 mL,  
Euphrasia officinalis D6...0,303 mL,  
Hepar sulphur D12.....0,303 mL.

Medicamento Homeopático

Solução Oftálmica Estérel

Apresentação: Contém 1 frasco  
de 10 ml

#### USO ADULTO E PEDIÁ- TRICO ACIMA DE 6 ANOS

#### Composição:

##### Cada ml contém:

Atropa belladonna D6...0,303 mL,  
Euphrasia officinalis D6...0,303 mL,  
Hepar sulphur D12.....0,303 mL,  
Excipientes q.s.p. 1 ml (ácido bórico,  
borato de sódio decaidratado,  
nitrato de sódio, sulfato de prata,  
água ultrapurificada). 22 gotas/mL.

#### 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

SIMILASAN-CLEAR® é indicado como auxiliar no tratamento dos sintomas decorrentes de irritações oculares como vermelhidão nos olhos e na conjuntiva, lacrimejamento, sensação de areia nos olhos, sensação de queimação, sensibilidade à luz. **A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério do prescriptor.**

#### 2. COMO ESTE MEDICA- MENTO FUNCIONA?

As indicações terapêuticas deste medicamento foram definidas conforme dados publicados na literatura homeopática. Este medicamento não foi submetido a estudos clínicos para comprovação de eficácia.

Este medicamento é preparado de acordo com os princípios homeopáticos incluindo o princípio básico de “semelhante pode ser curado pelo semelhante”. Ele auxilia as próprias energias de cura do organismo ao invés de substituí-las.

#### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento não deve ser utilizado no caso de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

#### 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Consulte um médico caso a sua condição não melhore dentro de 2 a 3 dias ou se sua condição piorar.

Procure um médico se apenas um olho for afetado, se o olho estiver excessivamente dolorido ou se a sua visão estiver embaçada.

Durante qualquer inflamação nos olhos não se aconselha o uso de lentes de contato. Se, no entanto, for imperioso utilizá-las, elas devem ser removidas antes da administração do medicamento e serem recolocadas no mínimo depois de 15 minutos. O uso de lentes de contato tende a deixar os olhos mais sensíveis.

Não utilize o medicamento se a solução mudar de cor ou ficar turva.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

#### 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Armazenar em local seco à temperatura ambiente - até 30 °C. Prazo de validade: 36 meses.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

**Após aberto, válido por 30 dias.**

Características físicas e organolépticas do medicamento: líquido límpido, incolor, sem odor e sabor.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.**

**Caso ele esteja no prazo de validade e você observar alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

**Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética como, por exemplo: forno de microondas, aparelho celular, televisão, etc.**

#### 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Desde que não prescrito de outra forma, utilizar uma a duas gotas, se necessário, várias vezes ao longo do dia ou da noite. A duração do efeito do medicamento homeopático pode ser diferente em cada indivíduo; ele deve ser reaplicado quando o seu efeito cessar ou quando os sintomas forem percebidos novamente.



## SIMILASAN-CLEAR<sup>®</sup>, gotas oftálmicas estéreis

V2.0 BBR2070

Se lentes de contato forem utilizadas, recomenda-se aplicar o medicamento no fim do dia, após a remoção das lentes, e de manhã, no mínimo 15 minutos antes de colocá-las. Apertar o conta-gotas de plástico entre o polegar e o indicador e administrar as gotas nos olhos.

Evitar o contato entre a ponta do conta-gotas e o globo ocular, cílios ou dedos.

Recolocar a tampa imediatamente após o uso.

Utilizar antes do vencimento do prazo de validade.

**Mantenha sempre a dose e a frequência de uso indicadas pelo prescritor ou o modo de usar sugerido nesta bula. Não desaparecendo os sintomas em até 3 dias, consulte um profissional de saúde. No caso de aparecimento de sinais e sintomas de alerta que indiquem gravidade, procure avaliação médica com urgência.**

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista. Informe ao seu médico, cirurgião-dentista o aparecimento de sintomas novos, agravamento de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos.**

**O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas.**

**Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações.**

### **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

**Caso você esqueça de usar o medicamento, não duplique a quantidade de medicamento na próxima aplicação.**

### **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Os componentes ativos deste medicamento são ultradiluídos pelo processo de dinamização, de acordo com a farmacopeia homeopática e, portanto, não são tóxicos e não causam efeitos colaterais conhecidos. Raramente pode ocorrer a exacerbação inicial dos sintomas antes que uma melhora seja percebida. Isto faz parte do processo de cura homeopática. **Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

**Em caso de sintomas que causem mal estar durante o tratamento, procure seu médico ou farmacêutico.**

### **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Até o momento não são conhecidos sintomas de superdose com este medicamento.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

#### **DIZERES LEGAIS**

Medicamento dinamizado notificado junto à Anvisa conforme Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 721, de 1º de julho de 2022.

#### **Responsável Técnico:**

Dr. Raul Diniz Ragazzi  
CRF-SP nº 56686

#### **Importado por:**

Ophthalmos Ltda.  
Avenida Manoel Monteiro de Araujo, 1051 - Lote A  
Parque São Domingos,  
São Paulo, SP  
CNPJ: 61.129.409/0001-05  
SAC: 0800 2098080

#### **Notificado por:**

Ophthalmos Ltda.  
Avenida Manoel Monteiro de Araujo, 1051 - Lote B  
Parque São Domingos,  
São Paulo, SP  
CNPJ: 61.129.409/0003-69

#### **Produzido por:**

Similasan AG  
Chriesiweg 6  
CH-8916 Jonen  
Suíça

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação de um profissional da saúde.